Examenul naţional de bacalaureat 2024
Proba E. c)
Matematică *M_mate-info*

Model ianuarie2024

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I **(30 puncte)**

1.	$\log_3\left(\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{4}\right)-\log_3\frac{1}{\sqrt[3]{25}+\sqrt[3]{20}+\sqrt[3]{16}}=\log_3\left(\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{4}\right)+\log_3\left(\sqrt[3]{25}+\sqrt[3]{20}+\sqrt[3]{16}\right)=$ $=\log_3\left(\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{4}\right)\left(\sqrt[3]{25}+\sqrt[3]{20}+\sqrt[3]{16}\right)=\log_3(5-4)=0$	**3p** **2p**
2.	Cum funcția este inversabilă pentru orice x real, avem $f^{-1}(x)=\frac{x-b}{a}$, $a\neq 0$ Condiția din enunț devine $ax+b-\frac{x-b}{a}=\frac{8}{9}(ax+b+1)\Rightarrow a=3, b=2$ sau $a=-3$, $b=-4$ care nu convine.	**2p** **3p**
3.	Din $\log_{\frac{1}{2}}\left(\log_2 x\right)<\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{2}\Rightarrow\log_2 x>\frac{1}{2}=\log_2\sqrt{2}$ $x\in\left(\sqrt{2},\infty\right)$	**3p** **2p**
4.	$2024=2^3\cdot 11\cdot 23$. Numerele de două cifre, divizori ai lui 2024 sunt: $\{11, 22, 23, 44, 46, 88, 92\}$, deci avem 7 cazuri favorabile. Sunt 90 de numere formate din două cifre, deci avem 90 cazuri posibile Probabilitatea este $P=\frac{7}{90}$	**3p** **2p**
5.	$\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=\frac{m+6}{\sqrt{13}\cdot\sqrt{(m+2)^2+m^2}}, \cos\left(\vec{b},\vec{c}\right)=\frac{5m+4}{\sqrt{13}\cdot\sqrt{(m+2)^2+m^2}}$ $\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=\cos\left(\vec{b},\vec{c}\right)\Rightarrow m=\frac{1}{2}$	**3p** **2p**
6.	Cum $\cos 2x=1-2\sin^2 x$, ecuația devine $2\sin^3 x+\sin^2 x-\sin x-2=0\Leftrightarrow(\sin x-1)\left(2\sin^2 x+3\sin x+2\right)=0$ Soluția care convine este $x\in\left\{\frac{\pi}{2}+2k\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$	**3p** **2p**

Str. Lucian Blaga, nr. 26
550169, Sibiu
Tel: +40 (0) 369 10 12 02
Fax: +40 (0) 269 21 08 17
www.isjsb.ro

SUBIECTUL al II-lea **(30 puncte)**

1.a)	$\alpha^2=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\1&2&3&4\end{pmatrix}=e$	**3p**
	$\alpha^{2024}=\left(\alpha^2\right)^{1012}=e$	**2p**
b)	$\beta^{-1}=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&4&1&2\end{pmatrix}=\beta$	**2p**
	$x=\alpha^{-1}\cdot\beta^{-1}=\alpha\cdot\beta=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&3&2&1\end{pmatrix}$	**3p**
c)	Fie $x=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\a&b&c&d\end{pmatrix}\in S_4$. Ecuația devine	**2p**
	$\begin{pmatrix}1&2&3&4\\a&b&c&d\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&2&3&4\\a&b&c&d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&4&1&2\end{pmatrix}$ Se obțin soluțiile $x_1=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&1\end{pmatrix}, x_2=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&1&2&3\end{pmatrix}$	**3p**
2.a)	$\hat{3}\circ x=x+\hat{4}+\hat{2}=x,$ pentru orice $x\in\mathbb{Z}_6$	**2p**
	$x\circ\hat{3}=\hat{4}+x+\hat{2}=x,$ pentru orice $x\in\mathbb{Z}_6$, deci $\hat{3}$ este element neutru al legii de compoziție	**3p**
b)	$x\circ x\circ x=x\Leftrightarrow\left(x+\hat{4}\right)\left[\left(x+\hat{4}\right)^2-\hat{1}\right]=\hat{0}$	**2p**
	Toate elementele $x\in\mathbb{Z}_6$ verifică ecuația.	**3p**
c)	$f\left(x\right)=x\circ\hat{1}=\hat{5}x+\hat{4}$	**2p**
	Cum $f\left(\hat{0}\right)=\hat{4}, f\left(\hat{1}\right)=\hat{3}, f\left(\hat{2}\right)=\hat{2}, f\left(\hat{3}\right)=\hat{1}, f\left(\hat{4}\right)=\hat{0}, f\left(\hat{5}\right)=\hat{5}$ funcția este bijectivă	**3p**

SUBIECTUL al III-lea **(30 puncte)**

1.a)	$f'\left(x\right)=-2^{\frac{1}{x}}\ln 2\frac{1}{x^2}<0$ pentru orice $x\in\left(-\infty,0\right)\cup\left(0,\infty\right)$ deci f este strict descrescătoare pe $\left(-\infty,0\right)\cup\left(0,\infty\right)$	**3p**
	Cum $\lim\limits_{x\to-\infty}f\left(x\right)=1, \lim\limits_{x\to\infty}f\left(x\right)=1, \lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}}f\left(x\right)=0, \lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}f\left(x\right)=\infty$, Im $f=\left(0,1\right)\cup\left(1,\infty\right)$	**2p**
b)	$f''\left(x\right)=\frac{2^{\frac{1}{x}}\ln 2}{x^4}\left(\ln 2+2x\right)$	**2p**
	$\frac{2^{\frac{1}{x}}\ln 2}{x^4}>0$, $\ln 2+2x>0\Rightarrow f''\left(x\right)>0$ pentru orice $x>0$, deci funcția f este convexă pentru orice $x>0$	**3p**

Str. Lucian Blaga, nr. 26
550169, Sibiu
Tel: +40 (0) 369 10 12 02
Fax: +40 (0) 269 21 08 17
www.isjsb.ro

c)	$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2^{\frac{1}{x}}-1}{-2^{\frac{1}{x}}\ln 2}\cdot x^2=-\dfrac{1}{\ln 2}\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\left(2^{\frac{1}{x}}-1\right)\cdot x}{2^{\frac{1}{x}}}\cdot x.$ Cum $\lim\limits_{x\to\infty}\left(2^{\frac{1}{x}}-1\right)\cdot x=\ln 2$ avem $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-1}{f'(x)}=-\infty$	**3p** **2p**
2.a)	$\int\left(x^2-x+1\right)f(x)\,dx=\int\dfrac{1}{x(x+1)}dx$ $=\int\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}\right)dx=\ln\dfrac{x}{x+1}+c,c\in\mathbb{R}$	**2p** **3p**
b)	$\int\limits_1^2\dfrac{1}{x\left(x^3+1\right)}dx=\dfrac{1}{3}\int\limits_1^2\dfrac{3x^2}{x^3\left(x^3+1\right)}dx$. Folosind notația $x^3=t$ se obține $\dfrac{1}{3}\int\limits_1^8\dfrac{1}{t(t+1)}dt=\dfrac{1}{3}\ln\dfrac{16}{9}$	**3p** **2p**
c)	$\int\limits_1^2 x^{-n+1}f(x)dx=\int\limits_1^2 x^{-n+1}\dfrac{1}{x\left(x^3+1\right)}dx=\int\limits_1^2\dfrac{1}{x^n\left(x^3+1\right)}dx$ Cum $0<\dfrac{1}{x^n\left(x^3+1\right)}<\dfrac{1}{x^n}$. Se obține $\lim\limits_{n\to\infty}\int\limits_1^2 x^{-n+1}f(x)dx=0$	**2p** **3p**

Str. Lucian Blaga, nr. 26
550169, Sibiu
Tel: +40 (0) 369 10 12 02
Fax: +40 (0) 269 21 08 17
www.isjsb.ro