Examenul național de bacalaureat 2026
Proba E.c)
Matematică M_mate-info
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Decembrie 2025

Simulare
Varianta 1

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

- **Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.**
- **Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.**
- **Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.**

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	$z=(2+4i):(1-i)$ $z=-1+3i$, $\text{Im}(z)=3$	2p 3p
2.	$\Delta<0$ $m\in(2,+\infty)$	2p 3p
3.	$x^2-x-12=0$ $x^2-x-12=0\Leftrightarrow x\in\{-3,4\}$. $x=4$ este singura soluție a ecuației considerate	3p 2p
4.	Mulțimea A are 4 submulțimi cu trei elemente care sunt formate doar din numere pare Mulțimea A are 35 de submulțimi cu trei elemente. Probabilitatea cerută este $\frac{4}{35}$	2p 3p
5.	$\overrightarrow{AB}=3\vec{i}+2\vec{j}$ și $\overrightarrow{CO}=-6\vec{i}-4\vec{j}$ $\overrightarrow{CO}=-2\overrightarrow{AB}$, deci vectorii $\overrightarrow{AB}$ și $\overrightarrow{CO}$ au aceeași direcție	3p 2p
6.	$a=\sin^2 15^\circ+\cos^2(90^\circ-75^\circ)$ $a=\sin^2 15^\circ+\cos^2 15^\circ=1\in\mathbb{N}$	3p 2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.a)	$\det(A(m))=(3m+24+24)-(27+16+4m)$ $\det(A(m))=(3m+48)-(43+4m)=5-m$	3p 2p
b)	Pentru $m=5$ sistemul este compatibil nedeterminat. Dacă $z=\alpha$, $\alpha\in\mathbb{R}$, atunci x și y sunt soluțiile sistemului: $x+2y=-3\alpha$, $2x+3y=-4\alpha$ $(x,y,z)\in\{(\alpha,-2\alpha,\alpha)\mid\alpha\in\mathbb{R}\}$	3p 2p
c)	$\det(A^n(5))=(\det(A(5)))^n=0$, $n\in\mathbb{N}$, $n\neq 0$, $\det(I_3)=1$ $\det(A^n(5))\neq\det(I_3)$, pentru orice număr natural nenul n, deci $A^n(5)\neq I_3$, pentru orice număr natural nenul n	3p 2p

2.a)	$\frac{1}{3}*\frac{1}{6}=\left(\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{6}\right):\left(2\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{6}-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}+1\right)$ $\frac{1}{3}*\frac{1}{6}=\frac{1}{18}:\frac{11}{18}=\frac{1}{11}$	2p 3p
b)	$\frac{1}{2}\in M$, $x*\frac{1}{2}=x,\ \forall x\in M$ $\frac{1}{2}*x=x,\ \forall x\in M$	3p 2p
c)	$x*x*x=\frac{1}{9}\Leftrightarrow\frac{x^3}{3x^2-3x+1}=\frac{1}{9}$ $\frac{x^3}{3x^2-3x+1}=\frac{1}{9}\Leftrightarrow 9x^3-3x^2+3x-1=0\Leftrightarrow(3x-1)(3x^2+1)=0\Leftrightarrow x=\frac{1}{3}\in M$	3p 2p

SUBIECTUL al III-lea **(30 de puncte)**

1.a)	$f'(x)=\frac{(e^x-2)(e^x-1)-(e^x-2x)\cdot e^x}{(e^x-1)^2}=$ $=\frac{2xe^x-3e^x+2}{(e^x-1)^2},\ \forall x\in\mathbb{R},\ x\neq 0$	2p 3p
b)	$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=1$ Dreapta cu ecuația $y=1$ este asimptota orizontală spre $+\infty$ la graficul funcției f	3p 2p
c)	Se consideră funcția $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $g(x)=2xe^x-3e^x+2$. Avem $g'(x)=(2x-1)e^x, x\in\mathbb{R}$, deci funcția g este strict descrecătoare pe intervalul $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right]$ și strict crescătoare pe intervalul $\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$. Cum g este continuă pe $\mathbb{R}$, $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=2>0$, $g(0)=-1<0$, $g\left(\frac{1}{2}\right)=2\left(1-\sqrt{e}\right)<0$ și $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$, rezultă că funcția g se anulează în exact două puncte: $x_1\in(-\infty,0)$ și $x_2\in\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$. Funcția g are valori negative între x_1 și x_2 și valori pozitive în rest. Funcția f este strict crescătoare pe intervalul $(-\infty,x_1)$, strict descrescătoare pe intervalul $(x_1,0)$, strict descrescătoare pe intervalul $(0,x_2)$ și strict crescătoare pe intervalul $(x_2,+\infty)$, deci are exact două puncte de extrem: x_1 (punct de maxim) și x_2 (punct de minim)	3p 2p
2.a)	Funcția g este derivabilă și $g'(x)=-\frac{2}{3}\left((2-x)^{\frac{3}{2}}\right)'=-\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2}(2-x)^{\frac{1}{2}}(2-x)'$ $g'(x)=\sqrt{2-x}=f(x),\ \forall x\in(-\infty,2)$, așadar funcția g este o primitivă a funcției f	3p 2p

b)	$F(x)=g(x)+c$ și $F(1)=\frac{1}{3}$ $c=1$ și $F(x)=-\frac{2}{3}(2-x)\sqrt{2-x}+1$	2p 3p
c)	$\int \frac{f(-x^2)-f(x^2)}{f(x^4-2)}dx=\int \frac{\sqrt{2+x^2}-\sqrt{2-x^2}}{\sqrt{4-x^4}}dx=$ $\int \frac{1}{\sqrt{2-x^2}}dx-\int \frac{1}{\sqrt{2+x^2}}dx=\arcsin\frac{x}{\sqrt{2}}-\ln\left(x+\sqrt{2+x^2}\right)+C$	2p 3p